

Cocciniglie e virosi della vite

Come spiegato nelle circolari precedenti è importante porre la massima attenzione alle zone con presenza di cocciniglie in quanto portatrici, e causa di diffusione, della virosi dell'accartocciamento fogliare. In queste aree è quindi necessario impostare la difesa dalle primissime fasi vegetative utilizzando gli olii minerali (vedi circolare Cavit del 13 marzo).

TRATTAMENTO CONSIGLIATO

Olio bianco 1 - 2,5 l/hl + Zolfo bagnabile 500 g/hl oppure Polithiol 5 l/hl

- eseguire il trattamento allo stadio fenologico di **gemma cotonosa**;
- assicurarsi che l'olio bianco sia registrato in etichetta per la coltura vite (uva da vino).

Modalità di trattamento:

- **curare bene la bagnatura del fusto e nelle pergole doppie trattare ala per ala a volume normale**;
- ridurre i fenomeni di deriva, regolando il volume d'aria e la velocità di avanzamento;
- trattare con **temperature attorno ai 15°C** e con previsioni di **tempo asciutto** nei giorni seguenti all'intervento.



Con l'occasione si ricorda che, nelle zone sotto riportate, il mese prossimo vanno posizionati i diffusori per il contenimento della cocciniglia *Planococcus ficus* con il metodo della confusione sessuale (vedi circolare del 09 febbraio c.a.)

Gli areali interessati sono i seguenti:

- Canale
- Belluno v.se collina
- Belluno v.se fondovalle
- Avio Fontana
- Avio Ischia Masi
- Borghetto
- Avio Russie
- Mama d'Avio
- Avio Valbolca
- Avio Campiglio
- Serravalle

Per eventuali chiarimenti ed info contattare il tecnico di Cantina.

Avio 14.03.2024

Il Presidente
Lorenzo Libera

