



POTATURA A VERDE **Fondovalle - Bassa collina conoidi**

VIDEO TECNICO – INTERVENTI A VERDE

- Clicca sul link
https://youtu.be/CJ4rV1FTn_s
- Inquadra con la fotocamera del cellulare il QR Code



NOTE GENERALI

- Lo sviluppo vegetativo prosegue regolarmente in tutte le zone e varietà tranne che per il Pinot grigio che in alcuni casi risulta disomogeneo.
- Nel **fondovalle** lo stadio fenologico è di **3-4 foglie distese su Pinot grigio e di 5-6 sulle altre varietà**.
- Nelle **zone pedecollinari e di media collina** lo stadio fenologico varia dalle **4-5 alle 6-7 foglie distese**.
- **In questa settimana iniziare le operazioni di potatura a verde.**
- Tali operazioni sono fondamentali per una corretta gestione del vigneto, sia in termini di sanità che di qualità delle uve.

SCACCHIATURA

Obiettivo

- Operazione importante per il contenimento delle infezioni di oidio in quanto il fungo, ad inizio stagione, si insedia preferibilmente sulle foglie basali vicino al legno vecchio.
- Migliora l'arieggiamento nella zona del calcagno, riducendo l'affastellamento della vegetazione (maggiore efficacia dei trattamenti e minori tagli di potatura invernale).

Quando

- Iniziare il lavoro quando i polloni hanno raggiunto la lunghezza di 15-20 cm e sono ancora di consistenza erbacea; in tal modo si evitano ferite e danni alle piante.

Come

- Eliminare i polloni che crescono dal legno vecchio (fusto e branche).

DIRADAMENTO GERMOGLI

Obiettivo

- Migliorare il microclima attorno al grappolo (più aria e luce).
- Aumentare l'efficacia dei trattamenti fitosanitari.
- Ridurre la pressione delle malattie (oidio e peronospora) e quindi il rischio di infezioni.
- **Regolare la produzione.**

Quando

- Ad iniziare dallo stadio **vegetativo di 5-6 FOGLIE** quando i grappoli sono ben visibili.
- Nei vigneti giovani e deboli la selezione dei germogli va anticipata per evitare il consumo di preziose energie da parte della vite.
- In vigneti vigorosi è possibile posticipare l'intervento di qualche giorno per fare in modo che la vite sfoghi l'eccesso di vigore.
- **In tutte le situazioni, comunque, il diradamento dei germogli va ultimato prima dell'inizio della fioritura.**

Come

- Eliminare i germogli doppi, deboli e ventrali.
- Con germogliamento disomogeneo eliminare (o spuntare) il germoglio apicale sul capo a frutto per equilibrare la crescita degli altri germogli.
- Eliminare le foglie basali se presentano danni da ragnetto giallo.

DIRADAMENTO GERMOGLI

PRIMA



DOPO



Sulla pergola se necessario intervenire con la cimatura del germoglio apicale

