

BOLLETTINO DIFESA FONDOVALLE BASSA COLLINA CONOIDI

Venerdì 18/04/2025

METEO

- Prevista instabilità da inizio prossima settimana.
- Segui meteo.

FENOLOGIA

- Nelle zone e varietà più precoci siamo allo stadio di **3-5 foglie** distese con alcuni giorni di ritardo rispetto al 2024.

DIFESA

- Nella maggior parte dei vigneti è stato raggiunto lo stadio di vegetazione sensibile alla peronospora e oidio e i modelli previsionali indicano la possibilità d'inizio infezione.

Pertanto si consiglia di iniziare la difesa effettuando il trattamento a ridosso della prossima pioggia prevista, con una delle opzioni in tabella, preferendo per la peronospora l'opzione B o C.

- Vista l'incertezza delle previsioni meteo e la possibilità di piogge ravvicinate, l'eventuale trattamento con Rame (opzione A) va ripristinato dopo 20 mm di pioggia o comunque entro 3/4 giorni.
- Per la difesa dell'alta collina e montagna seguirà comunicazione specifica.

	PERONOSPORA			
	Principio attivo	Prodotto	Dose-hl	Note
A	RAME METALLO	PRODOTTI VARI	50-60 g	Ripristinare dopo 20 mm o 3/4 giorni
D	DITTANON	ENVITA SC	80-100 ml	Massimo 9 trattamenti del gruppo (DITIANON, FOLPET e FLUAZINAM)
В	DITIANON	DELAN SC		
С	FOLPET	PRODITTI VARI (FOLPAN 80 WDG,)	150 g	Massimo 4 trattamenti FOLPET entro fine fioritura

	U	Ш	<u>D.</u>	LO
--	---	---	-----------	----

	ZOLFO BAGNABILE a 300-500 g/hl nei vigneti di fondovalle e su varietà poco sensibili a oidio.	
	MISCELA: ZOLFO BAGNABILE a 300 g/hl + ZOLFO LIQUIDO (THIOPRON, HELIOSOUFRE) a 200 ml/hl.	

NEI VIGNETI TRATTATI CON OLIO MINERALE IN ALTERNATIVA ALLO ZOLFO UTILIZZARE

E	BACILLUS PUMILUS	SONATA a 400-500 g/hl - autorizzato nel biologico
---	------------------	---

Attenzione è molto importante curare la qualità di esecuzione del trattamento

- Usare la stessa velocità che si utilizzerà durante la stagione e trattare tutti i filari
- Non eccedere nei volumi di aria per evitare fenomeni di deriva
- Chiudere gli ugelli che non colpiscono la vegetazione