



# Bollettino di difesa provincia di Verona

**Comunicato n°7  
23/05/2025**

Nell'ultima settimana sono precipitati circa 55 mm di pioggia, la fioritura della vite è iniziata oramai in quasi tutte le zone, sia di collina che di fondovalle, e la crescita fogliare si attesta sulle 2 foglie/settimana. Il meteo prevede per i prossimi giorni tempo perlopiù soleggiato con temperature in aumento e possibilità di pioggia martedì/mercoledì.

Data la sensibilità del periodo florale, e viste le previsioni meteo, si consiglia di intervenire nelle giornate di venerdì/sabato (tempo permettendo) utilizzando uno dei prodotti riportati in tabella



**Dato l'inizio della fase florale della vite si invitano i soci a sospendere l' utilizzo del Glifosate per il diserbo primaverile.**

principio attivo	Nome commerciale	
<b>Folpet + Oxathiapiprolin</b>	Zorvec Vinabria	Max 1 tratt/anno entro fine fioritura
<b>Dithianon</b>	<b>Delan Pro</b> , Delan SC, Envita...	Max 9 tratt/anno (come gruppo) – Folpet max 4 tratt/anno entro fine fioritura
<b>Folpet</b>	Foliane 80wg, Folpan 80wdg...	
Rame (60 gr/hl rame metallo)	Prodotti vari	Poca resistenza al dilavamento (20 mm circa)

Per la difesa dall'oidio aggiungere uno dei seguenti prodotti

principio attivo	Nome commerciale	Note
Spiroxamina*	Prosper 300CS, Prosper 500 EC, Batam...	Max 3 tratt/anno
Penconazolo*	Scudex, Topas 200EW...	

Mefentrifluconazolo*	Revysion...	Max 4 tratt/anno ( <u>penconazolo entro fine fioritura</u> )
Zolfo bagnabile (gr.400/500 x hl)	Prodotti vari	Zone tardive/poco soggette ad oidio

\*Aggiungere gr 200/hl di zolfo bagnabile

