



Bollettino di difesa provincia di Verona

Comunicato n° 11
10/06/2025

Trattamento obbligatorio contro *Scaphoideus titanus* (vettore della Flavescenza dorata della vite)

Nei vigneti di riferimento (Rivoli v.se e Rivalta) per lo studio della fenologia sono state osservate neanidi di prima, seconda e terza età (N1, N2, N3) con prevalenza della terza età (per vedere le diverse fasi di sviluppo clicca sul link: <https://youtu.be/0vkRZeIGvKA>)

data	Rivoli Veronese							Brentino Belluno						
	L1	L2	L3	L4	L5	A	n°	L1	L2	L3	L4	L5	A	n°
12/05/25	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	7
19/05/25	100	0	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0	0	13
26/05/25	100	0	0	0	0	0	8	100	0	0	0	0	0	17
03/06/25	91	9	0	0	0	0	11	57	36	7	0	0	0	14
09/06/25	0	33	67	0	0	0	3	22	33	44	0	0	0	9



Neanide di prima età (L1). Neanide di seconda età (L2). Neanide di terza età (L3).

Come da comunicazione dell'U.O. Fitosanitario della Regione Veneto (Bollettino Vite n.9 del 04/06/2025 – <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/kTDynKi83EDJQ4Q>) è stata stabilita la 1° Finestra di Intervento Regionale. Rispettando l'ampia forbice temporale indicata, e sulla base del monitoraggio locale, si suggerisce di "ottimizzare" il periodo di intervento secondo il seguente schema:

date intervento

- **PRIMO TRATTAMENTO - dal 11 al 16 giugno**
- SECONDO TRATTAMENTO – (vedi prossimi comunicati)

Prodotti utilizzabili e previsti dal protocollo Trentino per il primo trattamento:

Nome commerciale	Nome commerciale	Note
Acetamiprid*	Epik SL, Kestrel...	consigliato
Flupyradifurone	Sivanto prime	consigliato
Etofenprox	Trebon Up, Sword Up	Consigliati nel prossimo trattamento
Tau-Fluvalinate	Mavrik EW...	

*efficace anche nei confronti delle cocciniglie

Si ricorda inoltre:

- Il trattamento deve essere eseguito solo dopo la fine della fase fiorale.
- Si raccomanda di trinciare il cotico con erbe in fioritura 2-3 giorni prima dell'intervento.
- Il rispetto delle finestre di Intervento regionali e del numero di trattamenti da eseguire è vincolante ai fini degli obblighi di lotta contro lo *Scaphoideus titanus* come riportato nel punto 5 de decreto.
- È raccomandata la massima diligenza operativa verso tutte le disposizioni riportate nel Decreto di Lotta Obbligatoria e nell'Allegato 1 (Modalità di preparazione ed esecuzione dei trattamenti obbligatori).
- Nelle fasce di rispetto definite in etichetta dei PF è raccomandato l'impiego del silicato di alluminio (caolino calcinato) o del caolino classificato come corroborante.
- Nelle zone ad alta presenza di cocciniglia, ove non si sia intervenuti precedentemente con Movento 48SC, si consiglia di utilizzare prodotti a base di Acetamiprid.